

UTVÄRDERING AV HUDEN VID KANYLENS INSTICKSTÄLLE (VIP-Score)



Kontrollera huden vid instickstället en gång per arbetsskift. Observera stickstället när du jobbar med kanylen. Dokumentera observationer och åtgärder i patientjournalen.

HUR SER HUDEN UT VID INSTICKSTÄLLET?

GRAD Vip-score

ÅTGÄRDER

Huden vid instickstället
ser frisk ut

1

Dokumentera observationerna i
patientjournalen

Lindrig rodnad och/eller smärta
vid instickstället

2

Dokumentera observationerna i patientjournalen

Informera läkaren om en möjlig infektion

Perifer kanyl: Byt kanylens plats eller ta bort den
onödiga kanylen (EJ MIDLINE)

Central venkanyl: Rengör kanylens instickställe
och byt förband

Huden vid instickstället rodnar
och/eller är öm och/eller är
svullen och/eller utsöndrar eller
är tydligt infekterad

3

Dokumentera observationerna och åtgärderna i
patientjournalen

Anmäl infektion med blankett till hygieniskötare
eller via SAI-program

Perifer kanyl: Byt kanylens plats eller ta bort den
onödiga kanylen, informera läkaren, ta
bakterieodling från det utsöndrande instickstället
och blododlingar av patient med
infektionssymptom

Central venkanyl: Informera läkaren, ta
bakterieodling från det utsöndrande instickstället
och blododlingar av patient med
infektionssymptom, vid behov enligt läkarens
ordination ta bort kanylen och sätt kanylens spets
till odling