



KANYYLIN PISTOKOHDAN IHON ARVIOINTI (VIP-SCORE)

Tarkista kanyylin pistokohta kerran työvuorossa. Tarkkaile pistokohtaa kanyylin kanssa toimiessasi. Kirjaa havainnot ja toimenpiteet potilaskertomukseen.

MILTÄ KANYYLIN PISTOKOHDAN IHO VAIKUTTAÄ

ARVO Vip-score

TOIMENPITEET

Kanyylin pistopaikka
vaikuttaa terveeltä

1

Kirjaa havainnot
potilaskertomukseen

Lievää punoitusta ja/tai
kipua kanyylin
pistopaikan läheisyydessä

2

Kirjaa havainnot potilaskertomukseen

Informoi lääkärää

Perifeerinen kanyyli: Vaihda kanyylin paikkaa
tai poista tarpeeton kanyyli (EI MIDLINE)

Keskuslaskimokanyyli: Puhdista kanyylin
pistokohta ja vaihda sidokset

Kanyylin pistokohdan iho
punoittaa ja/tai on kipeä ja/tai
on turvoksissa ja/tai erittää ja/tai
on selvästi infektioitunut

3

Kirjaa havainnot ja toimenpiteet
potilaskertomukseen

Tee infektioilmoitus lomakkeella
hygieniahoitajalle tai SAI-ohjelman kautta

Perifeerinen kanyyli: Vaihda kanyylin paikkaa tai
poista tarpeeton kanyyli, informoi lääkärää, ota
erittäväästä kanyylin pistopaikasta bakteeriviljely
ja infektio-oireisesta potilaasta veriviljelyt

Keskuslaskimokanyyli: Informoi lääkärää, ota
erittäväästä kanyylin pistopaikasta bakteeriviljely
ja infektio-oireisesta potilaasta veriviljelyt,
lääkärin määräyksen mukaan tarvittaessa
kanyylin poisto ja sen kärjen viljely