



Veri- ja eritealtistustapaturman pikaohje

VÄLTÄMÄTTÖMÄT TOIMENPITEET ALTISTUNEELLE

Huuhtelu vedellä 10 min. Alkoholihaude (yli 70%) 5 min. Älä purista verta haavasta tai pistokohdasta.

VERITARTUNTAVAARAN RISKIN ARVIOINTI JA ALKUTOIMENPITEET

(Onko riskiä B-hepatiitille, C-hepatiitille tai HIV:lle?)

- ILMOITA:** Altistuneen on ilmoitettava tapaturmasta lähiesimiehelleen tai vuorovastaavalle, jonka on ryhdyttävä toimiin tartuttavuuden selvittämiseksi.
- TEE RISKIN ARVIOINTI:** Altistunut tai lähiesimies tarkistaa lähdepotilasta hoitavalta lääkäriltä, hammaslääkäriltä tai päivystävältä lääkäriltä tartunnan riskin
- VERINÄYTTEET:** Altistuneen esimies tai vuorovastaava vastaa lähdepotilaan verinäytteiden ohjelmoinnin toteutumisesta, tulosten tarkistamisesta, niihin reagoimisesta sekä niiden ilmoittamisesta altistuneelle.

EI
TARTUNTAVAARAA

LÄHDEPOTILAS
TUNTEMATON esim. jätteet

EPÄILY
TARTUNTAVAARASTA

VERITEITSE TARTTUVA
TAUTI TIEDOSSA

EI JATKOTOIMIA
ALTISTUNEELLE

LÄHDEPOTILAAN 0-NÄYTTEET OTETAAN PÄIVYSTYKSENÄ
S-Veriläh (23363) paketti sisältää S-HIVAgAb, S-HBsAg, S-HCVAgAb ja HCVNh

LÄHDEPOTILAAN NÄYTTEET
OVAT NEGATIIVISET
(= EI OLE VERITEITSE TARTTUVAA
TAUTIA)

LÄHDEPOTILAAN NÄYTE ON POSITIIVINEN
(TAI HERÄÄ VAHVA EPÄILY VERITEITSE TARTTUVASTA
TAUDISTA ENNEN VASTAUSTEN SAAMISTA)

EI JATKOTOIMIA
ALTISTUNEELLE

Jos altistuneella ei ole B-hepatiittirokotusta, tai sarja on vaillinainen, suositellaan yhteydenottoa virka-aikana omaan työterveyteen.

ALTISTUNEEN ROKOTUKSET, ESTOLÄÄKITYS, 0-NÄYTTEET:

- Jos lähdepotilas on HIV-positiivinen (tai vahva epäily):** estolääkitys päivystyksestä (VKS tai Pietarsaari) mahdollisimman pian (viimeistään 72 tunnin sisällä). Otetaan turvakokeet (PVK, ALAT, Krea) sekä otetaan altistuneen 0-näytteet (**S-VeriAlt 23362**, sisältää S-HIVAgAb, S-HBsAg, S-HBsAb, S-HBcAb, S-HCVAgAb). Jatkoseuranta tapahtuu VKS infektio-poliklinikalla.
- Jos lähdepotilas on HBsAg-positiivinen (tai vahva epäily) JA työntekijällä ei ole osoitettua rokotevastetta:** B-hepatiitti-immunoglobuliini ja B-hepatiittirokote 1-2 vuorokauden sisällä. Immunoglobuliini annetaan päivystyksessä (VKS tai Pietarsaari). Otetaan altistuneen 0-näytteet (**S-VeriAlt (23362)**).
- Muut tilanteet:** ei ole tarvetta päivystystoimintaan. Altistunut ottaa virka-aikana yhteyttä työterveyshuoltoon mahdollisia rokotuksia, verinäytteitä sekä seurantaa varten.

VERITAPATURMASTA ILMOITTAMINEN JA JATKOSEURANTA

- HaiPron kautta työturvallisuusilmoitus kaikista tartuntavaarallisista tapahtumista ja tapaturmailmoitus kaikista tapahtumista, joissa työntekijällä on aiheutunut terveyden tai turvallisuuden haittaa tai lähdepotilaalla tiedetään olevan veriteitse tarttuva tauti.
- Altistunut on itse yhteydessä omaan työterveyshuoltoon tai opiskelijaterveydenhuoltoon, jos on tarvetta jatkoseurannan järjestämiselle.